


スズメバチ

飛び方：速い。一直線に飛ぶ。

1 オオスズメバチ



体長27~40mm

よくみる度 ★★
つよい度 ★★★★★★
こわい度 ★★★★★★

①さされやすい時期
7~11月（特に9~10月）

②特徴
・ハチの中で最も大きい。
・攻撃性が高い。
・他のハチの巣を襲う。
・巣の場所が、分かりにくい。



場所
土の中
時期
4月下旬から
大きさ
30~80 cm

2 キイロスズメバチ



体長17~24mm

よくみる度 ★★★★★★
つよい度 ★★★★★★
こわい度 ★★★★★★


①さされやすい時期
7~11月（特に9~10月）

②特徴
・8月頃、巣が狭くなると、広い場所へ移動する習性がある。
・スズメバチの中では、最大の巣をつくる。



場所
軒下、屋根裏
時期
4月下旬から
大きさ
40~80 cm

3 コガタスズメバチ



体長21~27mm

よくみる度 ★★★★★★
つよい度 ★★★★★★
こわい度 ★★★★★★

①さされやすい時期
7~11月（特に9~10月）

②特徴
・スズメバチの中では、ややおとなしい。
・巣の始めは、徳利を逆さにしたような形。




場所
生垣、庭木
時期
5月上旬から
大きさ
25~30 cm

アシナガバチ

飛び方：後ろ足を長くたれ下げフワフワと飛ぶ。

1 フタモンアシナガバチ



体長14~18mm

よくみる度 ★★★★★★
つよい度 ★★★★★
こわい度 ★★


①さされやすい時期
6~8月、9~10月

②特徴
・9~10月、干してある洗濯物や布団に入り込み、人が刺されることがある。
（女王バチが冬を越すため）



場所
軒先、木の枝
時期
3月下旬から
大きさ
4~10 cm

2 セグロアシナガバチ



体長21~26mm

よくみる度 ★★★★★★
つよい度 ★★★★★
こわい度 ★★★★★


①さされやすい時期
7~8月（庭木の手入れをしているとき等）

②特徴
・8~9月、スズメバチの攻撃や台風により巣を失うと、残ったハチが近くの家のかべなどに集まることある。



場所
軒先、木の枝
時期
4月中旬から
大きさ
6~12 cm

3 キアシナガバチ



体長21~26mm

よくみる度 ★★★★★★
つよい度 ★★★★★
こわい度 ★★★★★

①さされやすい時期
7~8月（庭木の手入れをしているとき等）

②特徴
・アシナガバチでは、最も大きい。
・女王バチが、セグロアシナガバチと屋根裏などに集まり、冬を越す。



場所
軒先、木の枝
時期
4月中旬から
大きさ
6~12 cm

ミツバチ

セイヨウミツバチとニホンミツバチ



体長17~24mm

よくみる度 ★★★★★★
つよい度 ★★
こわい度 ★★★★★

場所
木の洞
時期
4月上旬から



①さされやすい時期

女王バチの死や付近で農薬散布のあったとき 寒冷期

②特徴

・同じ巣を数年使う。
・巣わけ（分封）をする。
・人を刺すと毒針が抜け、臭いで、近くのミツバチを刺激し、たくさんミツバチが攻撃してくる。

③巣わけ（分封）

毎年、4~6月に、新しい女王バチに巣をゆすり、旧女王バチが新しい巣を作る場所を求めて旅立つ。旅立つハチたちはおとなしく、木の枝などに集合して落ち着いた後、やがて他の場所に飛びさるので危険はない。

おまけ

スズメバチとアシナガバチの巣1シーズンしか使いません。次の年には、また新しい巣を作るよ！

さされやすい場所
頭、顔、足、うで、手、黒い色の部分はさされやすいよ！！

ハチは外敵から身を守るために攻撃します。巣やハチを刺激しなければ、むやみに刺さないよ。




もしも、さされてしまったら

1.キズを冷やす

- 水道の水
- 川の水
- ぬれタオル



2.くすりをつける



さされたあとぬるくすりです。

ハチの毒にはききません。



3.医師にみてもらう

●ハチアレルギーの人がさされたときにはショック症状を起すことがあります。

●ハチにさされて、ひどくはれる、じん麻疹、気分が悪くなるなどの症状がでたら、近くの人に救急車を呼んでもらうなどして、すぐに医師の手当を受けてください。

