

令和8年度 入学試験 「看護学」試験問題

受験番号

【試験上の注意】答えはすべて解答用紙に記入してください。

1. () 内に適切な語句を記入し、文章を完成させなさい。
 - 1) 固有胃腺の()細胞は、塩酸を分泌している
 - 2) 白血球の顆粒球には()、好塩基球、好酸球がある
 - 3) 皮膚は表面から表皮、()、皮下組織からなる
 - 4) 心電図のQRS波は、心臓の()の興奮である
 - 5) 大唾液腺は、耳下腺、顎下腺、()腺である
2. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。
 - 1) 心音の第Ⅰ音は房室弁が開き、動脈弁が閉じたときに生じる音である
 - 2) ビオー呼吸は、速いあえぎ呼吸が一時停止し無呼吸となることが繰り返され、周期は不規則である
 - 3) アトウォーターの係数では、炭水化物1gは4kcalの熱量を発生する
 - 4) 汗腺のエクリン腺は、腋窩、陰部などに限局して存在し、体温調節にはかかわっていない
 - 5) 小脳の機能には、視覚や眼球運動の調節がある
3. 次の文章を読み、() 内から適切な語句を選び、記号を記入しなさい。
 - 1) 複数の薬物が同時に投与された場合、薬物の作用が弱められることを、(a 協力作用 b 拮抗作用
c 相乗作用) という
 - 2) シスプラチンには強い(a 腎毒性 b 肝毒性)がある
 - 3) モルヒネには天井効果が(a ある b ない)
 - 4) (a グリシン b アルギニン c ロイシン)は、必須アミノ酸である
 - 5) クローン病患者は、不溶性食物繊維の(a 多い b 少ない)食事が望ましい
4. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。
 - 1) 長期臥床により、下肢の深部静脈に血栓を生じる危険性が高まる
 - 2) 原因が特定できない高血圧を、二次性高血圧という
 - 3) TNM分類は、褥瘡の進行度分類である
 - 4) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の原因は、おもに喫煙である
 - 5) A型肝炎は、経口感染により発症する
5. 以下の問いに答えなさい。
 - 1) 次の看護理論家と人間の概念の特徴について、組み合わせの正しいものを2つ選び、記号を記入しなさい。
 - (1) ロイ — 環境と相互作用を行っている生物的・心理的・社会的に統合された存在
 - (2) ヘンダーソン — 環境から影響を受ける存在で、自然治癒力をもつ
 - (3) ペプロウ — セルフケア能力を有する生物的・心理的・社会的存在
 - (4) トラベルビー — 常に生成・進化・変化という継続した過程の中にある、独特でかけがえのない個人
 - (5) ナイチンゲール — 意思と知力と体力が備わっていれば自立できる存在

2) マズローによる人間のニードについて、上から2番目の階層に含まれるニードを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 安全な家に住みたい
- (2) 自分の能力を発揮したい
- (3) 部活のメンバーに入りたい
- (4) トイレで排泄がしたい
- (5) 仲間から尊敬されたい

3) 次の組み合わせで、正しいものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 守秘義務 _____ 医療法
- (2) 権利擁護 _____ インフォームドコンセント
- (3) ヘルスプロモーション _____ オタワ憲章
- (4) 患者の権利 _____ ヘルシンキ宣言
- (5) 健康寿命の延伸 _____ アルマ・アタ宣言

6. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。

- 1) 国際生活機能分類（ICF）では、環境因子や個人因子を調整することで、障害をもちながらも健康的で質の高い生活を送ることを目指している
- 2) 医療計画は、地域の人口や年齢構成などといった地域の実情に応じた医療提供体制を整備するために、都道府県が3年ごとに策定している
- 3) 病院とは、医師または歯科医師が医療を行う場所で、19床以上の入院施設をもつ施設をいう
- 4) キューブラー＝ロスの「死の受容段階」の第4段階は「取り引き」である
- 5) 看護記録は、「医療法」による「診療に関する諸記録」に含まれ、保存期間は2年間と定められている
- 6) 思いがけないできごとがおこり、これに対して適切な処理が行われないと事故になる可能性のあることがらをインシデントという
- 7) 防衛機制の合理化とは、自分に都合のよい理由付けをして、自分の行動を正当化することをいう

7. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。

- 1) 包帯法のうち環行帯は、同じ部位を環状に巻く方法である
- 2) ストレッチャーによる上り坂の移送では、患者の頭部から進む
- 3) 浣腸液の温度が低すぎると、腸粘膜の毛細血管の収縮によって血圧が低下する
- 4) 膝関節の良肢位は、屈曲10度である
- 5) 共感とは、自分も同じように感じ、理解することである
- 6) 清拭時、背部は冷覚が鋭敏であるため高めの温度で拭く
- 7) 成人患者の経鼻栄養チューブの挿入の長さは、30～40cmである

8. 次の文章を読み、() 内から適切な語句を選び、記号を記入しなさい。

- 1) 血圧測定時、マンシエットの幅が狭い場合は通常より (a 高く b 低く) 測定される
- 2) 環境調整について、病室で最低限維持すべき照度は (a 50 b 100) ルクスである
- 3) 患者に使用した注射針は、(a 赤 b 黄) 色のバイオハザードマークがついている容器に入れる
- 4) 寝衣交換時、片側上肢に障害がある場合は (a 健 b 患) 側から脱がせる
- 5) 睡眠への援助として、入眠前に寝具をあたためると手足の末梢血管が (a 拡張 b 収縮) し、深部体温が下がるため効果的である
- 6) 湯たんぽ使用時には、低温熱傷を防ぐため身体から (a 5 b 10) cm程度離して置く

9. 以下の問いに答えなさい。

- 1) 5%の次亜塩素酸ナトリウムを用いて0.02%希釈液2000mLをつくるのに必要な薬液量を求めなさい。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
- 2) 身長180cm、体重70kgの成人のBMI（体格指数）を求めなさい。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。

10. 次の文章を読み、() 内に語群から適切な語句を選び、記号を記入しなさい。

- 1) エリクソンの発達課題では、前成人期は()である
- 2) 10代後半から30代までの死因の第1位は()である
- 3) がん患者が自分の病気や治療法などについて十分な情報を医療者から得たうえで、選択・同意することを()という
- 4) 特定健康診査では、メタボリックシンドロームに着目して、()の測定および血圧、血糖、脂質などに関する検査を行う
- 5) 現在、日本の人口ピラミッドは()型である

語群

a	コンプライアンス	b	心疾患	c	親密性対孤立	d	情報リテラシー	e	自殺	f	つば
g	体重	h	不慮の事故	i	つりがね	j	アイデンティティの確立対役割の拡散	k	腹囲		
l	ピラミッド	m	アドヒアランス	n	上腕周囲径	o	統合性対絶望	p	インフォームドコンセント		

11. 以下の問いに答えなさい。

1) 循環器疾患患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい

- (1) 頸静脈の怒張、肝腫大、下肢浮腫、腹水などの徴候を示す場合は左心不全を疑う
- (2) カルシウム拮抗薬を内服している患者にはグレープフルーツを摂取しないように指導する
- (3) ワルファリンを内服している患者にはビタミンKを多く含む食品を摂取しないように指導する
- (4) 下肢静脈瘤のある患者が下肢を挙上する時は膝窩動脈を圧迫しないように注意する

2) 肝硬変患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 肝性脳症の予防のために排便コントロールを行う
- (2) 肝性脳症の予防のために糖質を制限する
- (3) 食道静脈瘤がある場合は、極端に熱いもの、冷たいもの、硬いものは食べないように指導する
- (4) 見当識障害や羽ばたき振戦があれば医師に報告する

3) 経尿道的前立腺切除術(TUR-P)術後患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) TUR 症候群による低ナトリウム血症に注意する
- (2) 膀胱留置カテーテルによる牽引固定が正しく行われているかを観察する
- (3) 膀胱留置カテーテル抜去後は水分を控えるように指導する
- (4) 尿失禁に対して時間ごとの排尿や骨盤底筋訓練の指導を行う

4) 全身性エリテマトーデス患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 天気のよい日に外出するときは、露出の少ない衣服を着用し帽子や日傘を使用するように指導する
- (2) 副腎皮質ステロイド薬は症状に合わせ量を増減するように指導する
- (3) 手袋・靴下を着用し、十分な保温に努めるように指導する
- (4) 人ごみを避け、外出後はうがい・手洗いを励行するように指導にする

5) 神経麻痺の観察について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 橈骨神経麻痺は、手関節の背屈が可能かを観察する
- (2) 尺骨神経麻痺は、母指・小指の伸展が可能かを観察する
- (3) 正中神経麻痺は、母指・小指の対立運動が可能かを観察する
- (4) 腓骨神経麻痺は、足関節の伸展(背屈)が可能かを観察する

12. 以下の問いに答えなさい。

1) 呼吸器疾患患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 喀痰がある場合は、水分摂取を促す
- (2) 酸素療法の適応は、動脈血酸素分圧(PaO₂) 60 Torr 以下である
- (3) 気管支鏡検査直後は、飲水できる
- (4) 胸腔ドレーン挿入中は、エアリークを観察する

2) 血液疾患患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 出血傾向がある場合は、排便時の努責を避ける
- (2) ヘモグロビン8～9 g/dLの患者は、無理せず休養する
- (3) 易感染状態にある場合は、食事の制限はない
- (4) 出血傾向の患者が出血した場合は、出血部位を圧迫する

3) 脳梗塞患者の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 失認・失行の有無を観察する
- (2) クッシング現象（血圧上昇と徐脈）に注意する
- (3) 静脈還流を促進するためにセミファロー位とする
- (4) 就寝前、水分を控えるよう説明する

4) 糖尿病の患者教育について、適切なものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) HbA1c（糖化ヘモグロビン）は、採血までの3～4か月間の血糖値の状況を反映する
- (2) 食事療法では、指示されたエネルギー量の40～60%をたんぱく質とする
- (3) 運動療法は、食後30分から3時間後に行う
- (4) 使用中のインスリンは、冷所に保存する

5) 婦人科における内診時の看護について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 体位は、載石位（砕石位）をとる
- (2) 内診前に排尿しないよう説明する
- (3) 軽く口を開き、ゆっくりと呼吸するよう説明する
- (4) 洗浄液は37℃程度にあたためておく

13. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。

- 1) 睡眠時無呼吸症候群患者の持続気道陽圧法（CPAP）は、毎日就寝時に使用する
- 2) アトピー性皮膚炎の患者は、かゆみによる掻破を予防する
- 3) 輸血療法中は、悪寒・戦慄の溶血性反応を観察する
- 4) 甲状腺切除術後は、発熱や徐脈の甲状腺クリーゼの症状を観察する
- 5) 慢性副鼻腔炎患者には、静かにゆっくり、片方ずつ鼻をかむように指導する

14. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。

- 1) 85歳以上の死因では悪性新生物が多く占めている
- 2) 高齢者は、喉頭の静止位置が下がり、嚥下時の喉頭の挙上が不十分となるため誤嚥しやすくなる
- 3) 高齢者は食事摂取量の低下によりたんぱく質・エネルギー低栄養状態（PEM）が多くみられる
- 4) フレイルは、加齢に伴って生理的機能が低下しストレスに対する脆弱性が亢進した状態である
- 5) 老人性難聴では、両耳の聴力が同時に低下する
- 6) 高齢者の肺機能の生理的变化で、残気量が低下する

15. 以下の問いに答えなさい。

1) 認知症患者とのコミュニケーションについて、適切なものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 作話があるときは内容を訂正する
- (2) 同じ内容を繰り返す場合は会話をすぐに打ち切る
- (3) 興奮状態のときは安全を確認して一旦席を外す
- (4) 母親が幼児と接するように話す
- (5) 話の内容がわからないときには、時間をかけて細やかに質問する

2) 術後せん妄のある高齢者とその看護について、適切なものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 手術後7日経過してから出現する
- (2) 長期的に続く幻覚や見当識障害がある
- (3) 日中も十分な睡眠を確保する
- (4) 手術後早期から離床を開始する
- (5) 転倒予防のために抑制をする

16. 以下の問いに答えなさい。

- 1) 本人の同意がなくてもその家族等のうち、いずれかの者の同意があり精神保健指定医の診察により入院の必要が認められた場合の精神科病院への入院形態を記入しなさい。
- 2) 次の文章を読み、精神看護について正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。
 - (1) 作業療法は、医師の処方箋が必要である
 - (2) 患者が自傷したことを話した時に「話してくれてありがとう」と伝えた
 - (3) 躁状態の患者が何度も家族に手紙を送り、家族から苦情があったため、手紙を禁止した
 - (4) 夜間、患者の自傷や他害のリスクがあった為、その場で拘束帯を使用した

17. 次の文章を読み、語群から適切な語句を選び、記号を記入しなさい。

- 1)フロイトは人間の心には3つの部分があるとした。その中で、良心や道徳的な側面であり、社会的規範や価値観のことを何というか。

語群

a イド	b 自我	c 超自我
------	------	-------

- 2) 自分が悪いことをしたと思ひ込む妄想を何というか。

語群

a 心気妄想	b 関係妄想	c 罪業妄想
--------	--------	--------

- 3) 患者から治療者側に向けられる感情の転移感情に対して、治療者側が私的な感情を抱くことを何というか。

語群

a 陽性転移	b 陰性転移	c 逆転移
--------	--------	-------

- 4) 精神科デイケアの対象となるのはどれか。

語群

a 入院している	b 通院している	c 医師に診断を受けていないが精神的な悩みがある
----------	----------	--------------------------

18. 以下の問いに答えなさい。

- 1) 母子保健統計に関連する用語について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。
 - (1) 妊産婦死亡とは、妊娠中または妊娠終了後満28日未満に、妊娠に関連して死亡したものをいう
 - (2) 周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをいう
 - (3) 死産とは、妊娠満12週以降の死児の出産をいう
 - (4) 合計特殊出生率は、1人の女性が生涯に何人子どもを産むのかを推計したものである
 - (5) 乳児死亡とは、生後1年未満の乳児の死亡をいう
- 2) 胎児付属物について、誤っているものを選び、記号を記入しなさい。
 - (1) 胎盤は妊娠16週頃には完成する
 - (2) 卵膜は脱落膜、絨毛膜、羊膜の3層からなる
 - (3) 臍帯の中には、1本の臍動脈と2本の臍静脈がある
 - (4) 羊水は弱アルカリ性である
 - (5) 羊水量は、妊娠第7～8か月に最大量に達する
- 3) 褥婦の看護について、正しいものを選び、記号を記入しなさい。
 - (1) 分娩後24時間は床上安静を促す
 - (2) 産褥5日目より浴槽に浸かってよい
 - (3) 陰部は肛門から尿道に向けて拭く
 - (4) 子宮収縮が不良な場合は、子宮底の輪状マッサージを行う
 - (5) 後陣痛は経産婦よりも初産婦に痛みを訴えるものが多い

19. 次の文章を読み、正しいものに○、誤っているものに×を記入しなさい。

- 1) 頭位、第2胎向は、児頭が子宮の下方にあり、児背が母体の右側にある
- 2) フリードマン曲線は、分娩の進行状況状態をグラフにしたものである
- 3) 受胎調節において排卵を防ぐ方法に、コンドーム法がある
- 4) 新生児が出生後6時間以内に排尿がみられない場合、泌尿器の異常を疑う

20. 次の文章を読み、() 内から適切な語句を選び、記号を記入しなさい。

- 1) 乳児期に左右の前頭骨と頭頂骨で囲まれた菱形のすき間を(a 大泉門 b 小泉門) という
- 2) 乳歯は生後(a 6～8 b 12～14) ヲ月ごろに生えはじめる
- 3) 身体発育のバランス評価として、乳幼児期には(a カウプ指数 b ローレル指数) を用いる
- 4) 乳児の体内の水分量の割合は、体重の(a 70 b 60) %である
- 5) 乳児の不慮の死亡事故の主な原因は(a 転落 b 窒息) である
- 6) 子どもの心肺蘇生法(CPR法)は、実施者2名の場合胸骨圧迫：人工呼吸比は、(a 15：2 b 30：2) で行う

21. 以下の問いに答えなさい。

1) 下痢症状のある子どもの看護として誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 症状があるときは、湯冷ましやお茶などを少量ずつ摂取させる
- (2) 下痢便は酸性で消化酵素を多く含むため肛門周囲の発赤やびらんなどをおこしやすい
- (3) 栄養補給として糖水やジュース類は欲しがらだけ与えてもよい
- (4) 感染が原因の場合、他児との接触は制限する

2) 気管支喘息患児の看護について誤っているものを選び、記号を記入しなさい。

- (1) 発作時は、啼泣や興奮させるような刺激を避ける
- (2) 発作の重症化が予測される場合は、バックマスク換気や気管挿管を準備しておく
- (3) 幼少児が吸入器や吸入薬の噴霧をいやがったりこわがったりする場合は、中止する
- (4) 幼少児の場合は家族の膝の上に抱くなど、患児が最も楽に呼吸できる体位を工夫する