

■ コメント

1. インフルエンザ

定点医療機関からの報告数が、85人(定点当たり2.30人、迅速診断キット:A型陽性84人、B型陽性1人)と、前週の約2.1倍に急増しました。インフルエンザは、例年流行が始まると短期間に感染が拡大するため、注意が必要です。(次頁参照)

手洗いや咳エチケットの励行、適度な湿度(50～60%)の保持、人ごみを避けるなど感染予防を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。また、症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。


2. 感染性胃腸炎

定点当たり6.13人の報告があり、前週と比べてやや増加しました。

3. つつが虫病

2件の報告があり、今年の累計は4件となりました。

インフルエンザの流行状況



■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)間	発生記号
小児科	インフルエンザ	85	2.30	0.34	↑
小児科	咽頭結膜熱	13	0.54	0.42	↔
小児科	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	78	3.25	2.54	↔
小児科	感染性胃腸炎	147	6.13	10.49	↔
小児科	水痘	15	0.63	0.89	↑
小児科	手足口病	14	0.58	0.51	↓
小児科	伝染性紅斑	1	0.04	0.21	↔
小児科	突発性発しん	5	0.21	0.47	↔
小児科	百日咳	1	0.04	0.03	↔
小児科	ヘルパンギーナ	-	-	0.13	↔
眼科	流行性耳下腺炎	3	0.13	0.65	↔
眼科	RSウイルス感染症	5	0.21	1.00	↓
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	0.10	↔
眼科	流行性角結膜炎	5	0.63	0.78	↔
基幹	細菌性髄膜炎	-	-	-	↔
基幹	無菌性髄膜炎	-	-	0.09	↔
基幹	マイコプラズマ肺炎	1	0.14	0.28	↔
基幹	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	↔
基幹	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	↔

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5～2の増減
微増減	↔	↔	前週と比較しておおむね1:1.1～1.5の増減
横ばい	↔	↔	ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ定点数(小児科定点を含む)	37
小児科定点数	24
眼科定点数	8
基幹定点数	7

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

■ 全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	2	124	女性(70歳代)・2人
4	つつが虫病	2	4	女性(50歳代)、男性(70歳代)
4	日本脳炎	1	2	女性(70歳代)・市外

■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

		インフル エンザ	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発疹	百日咳	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎	RSウィ ルス感 染症	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミ ジア肺 炎	(ロタウ イルス)	感染性 胃腸炎
報告数	広島市	第43週	1	12	59	99	2	61	-	7	-	8	1	22	-	3	-	-	-	-	-
		第44週	2	15	45	85	13	42	1	6	-	8	2	16	-	3	-	-	-	-	-
		第45週	7	9	62	82	10	40	2	8	-	4	2	16	-	7	-	2	-	-	-
		第46週	40	14	66	106	8	32	-	8	1	-	7	15	-	2	-	1	-	-	-
		第47週	85	13	78	147	15	14	1	5	1	-	3	5	-	5	-	1	-	-	-
定点当 たり	広島市	第43週	0.03	0.50	2.46	4.13	0.08	2.54	-	0.29	-	0.33	0.04	0.92	-	0.38	-	-	-	-	-
		第44週	0.05	0.63	1.88	3.54	0.54	1.75	0.04	0.25	-	0.33	0.08	0.67	-	0.38	-	-	-	-	-
		第45週	0.19	0.38	2.58	3.42	0.42	1.67	0.08	0.33	-	0.17	0.08	0.67	-	0.88	-	0.29	-	-	-
		第46週	1.08	0.58	2.75	4.42	0.33	1.33	-	0.33	0.04	-	0.29	0.63	-	0.25	-	0.14	-	-	-
		第47週	2.30	0.54	3.25	6.13	0.63	0.58	0.04	0.21	0.04	-	0.13	0.21	-	0.63	-	0.14	-	-	-
全国		第45週	0.52	0.63	2.19	4.27	0.44	1.41	0.07	0.43	0.01	0.24	0.38	0.88	0.01	0.85	0.04	0.05	0.52	0.01	0.01
		第46週	0.77	0.67	2.50	4.89	0.56	1.28	0.06	0.43	0.01	0.23	0.31	0.76	0.02	0.83	0.02	0.05	0.54	0.01	0.01

■ 新たに判明した病原体検出状況

(検査: 広島市衛生研究所)

診断名	主症状	年齢	性別	発症年月日	検査材料	検出病原体
手足口病	発熱(38.5) 丘疹 紅斑	2	男	2017/10/17	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA6型
ヘルパンギーナ	発熱(39.0) 関節痛	3	女	2017/10/13	咽頭拭い液	ライノウイルス
その他の呼吸器疾患	発熱(39.0) 上気道炎 気管支炎 肺炎 細気管支炎	0	女	2017/10/03	咽頭拭い液 鼻汁	RSウイルス
その他の呼吸器疾患	発熱(38.9)	0	女	2017/10/24	咽頭拭い液 咽頭拭い液 糞便	ライノウイルス エコーウイルス25型
その他の疾患	発熱(38.3)	0	男	2017/10/16	糞便	エコーウイルス25型
その他の疾患	発熱(38.7)	0	男	2017/10/19	咽頭拭い液 糞便	エコーウイルス25型

* 感染症発生動向調査に基づく病原体定点搬入分のみ掲載

【参考】広島市におけるインフルエンザの流行開始からピークまでの期間

シーズン	流行開始時期 (定点当たり1.00人以上となった週)	ピークとなった週と その週の定点当たり報告数	流行開始から ピークまでの期間
2017/18	第46週 (11月13日 ~ 11月19日)		
2016/17	第46週 (11月14日 ~ 11月20日)	第 4週 (1月23日 ~ 1月29日) 36.3人	10週間
2015/16	第 2週 (1月11日 ~ 1月17日)	第 6週 (2月 8日 ~ 2月14日) 57.0人	4週間
2014/15	第49週 (12月 1日 ~ 12月 7日)	第 4週 (1月19日 ~ 1月25日) 50.6人	7週間
2013/14	第52週 (12月23日 ~ 12月29日)	第 5週 (1月27日 ~ 2月 2日) 21.3人	5週間
2012/13	第51週 (12月17日 ~ 12月23日)	第 4週 (1月21日 ~ 1月27日) 50.6人	5週間

インフルエンザ定点医療機関(市内37か所)からの報告数です。

過去5シーズンにおける流行開始からピークまでの期間の平均は6.2週間となっています。

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。
なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

URL <http://www.city.hiroshima.lg.jp/eiken/center.html>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL(082)277-6575 FAX(082)277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp

2017年第47週(11月20日~11月26日)