

コメント

1. ヘルパンギーナ

定点当り3.46人とやや減少していますが、多い状態が続いています。安芸区11.5人、佐伯区6.7人と特に多く、東区、南区ともに3.7人となっています。

2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点当り1.88人と増加しています。佐伯区では7.0人と特に多く、東区3.7人となっています。


3. 手足口病

定点当り1.00人と急減しています。安芸区では5.5人となっています。

4. 麻疹 成人麻疹

麻疹、成人麻疹ともに報告はありません。

ヘルパンギーナ



5類感染症報告状況 (定点把握対象分)

| 疾患名 | 報告数 | 定点当り | 平均過去5年(注1) | 発生記号 | 疾患名 | 報告数 | 定点当り | 平均過去5年(注1) | 発生記号 |
|---------------|-----|------|------------|------|-------------|-----|------|------------|------|
| インフルエンザ(注2) | - | - | 0.01 | | 麻疹(注3) | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 0.38 | 0.66 | ↓ | 流行性耳下腺炎 | 7 | 0.29 | 1.20 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 45 | 1.88 | 1.16 | ↗ | RSウイルス感染症 | 1 | 0.04 | - | |
| 感染性胃腸炎 | 73 | 3.04 | 4.16 | ↖ | 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.13 | - | |
| 水痘 | 22 | 0.92 | 1.42 | ↖ | 流行性角結膜炎 | 3 | 0.38 | 1.10 | |
| 手足口病 | 24 | 1.00 | 10.26 | ↓ | 細菌性髄膜炎 | - | - | 0.03 | |
| 伝染性紅斑 | 4 | 0.17 | 0.73 | | 無菌性髄膜炎 | 1 | 0.14 | 1.40 | |
| 突発性発疹 | 24 | 1.00 | 0.91 | | マイコプラズマ肺炎 | 2 | 0.29 | 0.37 | |
| 百日咳 | 1 | 0.04 | 0.02 | | クラミジア肺炎(注4) | - | - | - | |
| 風疹 | - | - | 0.01 | | 成人麻疹 | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 83 | 3.46 | 3.61 | ↖ | | | | | |

| | | |
|-----|-----|-----------------------|
| 急増減 | ↑ ↓ | 前週と比較しておおむね1.2以上の増減 |
| 増減 | ↗ ↘ | 前週と比較しておおむね1.15~2の増減 |
| 微増減 | ↖ ↗ | 前週と比較しておおむね1.1~1.5の増減 |
| 横ばい | → | ほとんど増減なし |

報告数が少ないなど、傾向の判断が不適切と思われるものについては、発生記号を記載していません。

| | |
|----------------------|----|
| インフルエンザ定点数(小児科定点を含む) | 37 |
| 小児科定点数 | 24 |
| 眼科定点数 | 8 |
| 基幹定点数 | 7 |

(注1) 過去5年間 (RSウイルス感染症は3年間) の同時期平均 (定点当り)
 (注2) 鳥インフルエンザを除く
 (注3) 成人麻疹を除く
 (注4) オウム病を除く

1類 ~ 5類感染症報告状況 (全数把握対象分)

| 類型 | 疾患名 | 報告数 | 累積 | 備考 |
|----|----------------|-----|----|---------------------|
| 2 | 結核 | 2 | 70 | 男性 (40歳代)、女性 (80歳代) |
| 5 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 2 | 女性 (80歳代) |

5類感染症報告状況の推移 (定点把握対象分)

| 報告数 | 広島市 | 第24週 第25週 第26週 第27週 第28週 | インフルエンザ (注1) | 咽頭結膜熱 球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ 球菌 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | 風しん | ヘルパンギーナ | 麻しん (注2) | 流行性耳下腺炎 | RSウイルス 感染症 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ 肺炎 | クラミジア肺炎 (注3) | 成人麻しん | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------|------|-------|--------|------|------|---------|-------------|---------|---------------|----------|---------|--------|--------|---------------|-----------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 定点 当り | 広島市 | 第24週 | 0.03 | 0.67 | 2.25 | 5.38 | 2.08 | 0.50 | 0.29 | 0.92 | - | - | 3.21 | 0.08 | 0.21 | - | - | 0.38 | - | - | 0.29 | - | 0.14 | |
| | | 第25週 | - | 0.46 | 1.75 | 5.08 | 1.25 | 0.96 | 0.38 | 1.08 | 0.04 | - | 3.67 | 0.08 | 0.17 | - | - | 0.50 | - | 0.14 | 0.43 | - | 0.14 | |
| | | 第26週 | - | 0.50 | 1.29 | 3.96 | 1.08 | 1.50 | 0.42 | 1.00 | 0.04 | - | 3.67 | - | 0.13 | 0.38 | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |
| | | 第27週 | - | 1.00 | 1.25 | 4.13 | 1.04 | 2.21 | 0.25 | 1.04 | - | 0.04 | - | 4.29 | 0.08 | 0.08 | - | - | 0.88 | - | 0.14 | 0.29 | - | - |
| | | 第28週 | - | 0.38 | 1.88 | 3.04 | 0.92 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 0.04 | - | 3.46 | - | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.38 | - | 0.14 | 0.29 | - | - | - |
| 全国 | 第26週 | 0.19 | 0.54 | 1.94 | 4.25 | 1.71 | 1.15 | 1.00 | 0.79 | 0.02 | 0.01 | 2.17 | 0.03 | 0.50 | - | - | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.08 | |
| | 第27週 | 0.18 | 0.56 | 1.63 | 3.94 | 1.30 | 1.52 | 0.83 | 0.80 | 0.02 | - | 3.28 | 0.03 | 0.50 | - | - | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.06 | |

(注1)鳥インフルエンザを除く (注2)成人麻しんを除く (注3)オウム病を除く

5類感染症報告状況の推移 (STD (性感染症) 基幹定点月単位報告分)


| 報告数 | 広島市 | 5月 6月 | STD (性感染症) 定点 | | | | | | | | | | | | 基幹定点 | | | | | | | | |
|----------|-----|----------|---------------|------|------|-------------------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|-----------------------|------|------|--------------------|------|------|----------------|------|------|
| | | | 性器クラミア 感染症 | | | 性器ヘルペス ウイルス感染症 | | | 尖圭コンジローマ | | | 淋菌感染症 | | | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 | | | ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | | | 薬剤耐性 緑膿菌感染症 | | |
| | | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 定点 当り | 広島市 | 5月 | 2.33 | 2.11 | 0.22 | 2.00 | 1.22 | 0.78 | 1.33 | 1.11 | 0.22 | 2.67 | 2.56 | 0.11 | 6.14 | 4.00 | 2.14 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.14 |
| | | 6月 | 3.11 | 2.00 | 1.11 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.11 | 0.89 | 0.22 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 6.14 | 3.43 | 2.71 | 0.71 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
| 全国 | 6月 | 2.76 | 1.25 | 1.52 | 0.80 | 0.33 | 0.46 | 0.59 | 0.34 | 0.26 | 0.94 | 0.76 | 0.17 | 4.40 | 2.87 | 1.53 | 1.01 | 0.56 | 0.45 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | |

定点数 STD定点9 基幹定点7

新たに判明した病原体検査結果

新たな検査結果はありません。

【参考】広島市におけるヘルパンギーナの年齢別構成比



ヘルパンギーナは、主にコクサッキーA群ウイルスを病原体とし、発熱と口の中に水疱ができることが特徴です。

潜伏期間は2～4日で、突然発熱し、38～40の高熱が2～4日間程度続くとともに、口の中(特に奥の上側の部分)に水疱ができ、痛みを伴います。また、全身倦怠感、食欲不振、のどの痛み、嘔吐などを伴う場合があります。基本的には軽症ですが、まれに無菌性髄膜炎などを併発する場合があります。

患者は乳幼児が多く5歳以下が約90%を占めています。

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページをご覧ください。

URL <http://www.city.hiroshima.jp/shakai/eiken/center.html>

【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
TEL(082)277-6575 FAX(082)277-5666 E-Mail eiken@city.hiroshima.jp

2007年第28週 (7月9日～7月15日)