

広島市感染症週報

広島市感染症対策協議会・広島市感染症情報センター

コメント

1 感染性胃腸炎


定点当たり13.35人の報告があり、多い状況です。1月以降に感染性胃腸炎の集団発生が5件報告されており、そのうち3件がノロウイルスによるものでした。こまめな手洗い、便・吐物の適切な処理など、感染予防対策を徹底しましょう。(次ページ参照)

2 RSウイルス感染症

定点当たり1.17人の報告があり、増加傾向です。また、例年同時期より多い状況が続いており、注意が必要です。感染経路は、飛沫感染、接触感染です。おもちゃや手すりなど手の触れる部分の消毒や手洗いの励行、咳エチケットなど、感染予防対策を心がけましょう。

3 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点当たり2.83人の報告がありました。引き続き、手洗い、換気、マスク着用推奨場面(医療機関や高齢者施設等の訪問時)でのマスク着用など、感染予防対策を徹底しましょう。



■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)

定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)	発生記号	定点種別	疾患名	報告数	定点当たり	平均過去5年(注)	発生記号
インフル	インフルエンザ	37	1.03	6.39	◇	小児科	ヘルパンギーナ	1	0.04	0.05	◇
	新型コロナ(COVID-19)	102	2.83	◇	◇		流行性耳下腺炎	-	-	0.02	◇
小児科	RSウイルス感染症	27	1.17	0.29	◇	眼科	急性出血性結膜炎	1	0.13	0.05	◇
	咽頭結膜熱	13	0.57	0.39	◇		流行性角結膜炎	1	0.13	0.45	◇
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	31	1.35	1.25	◇	基幹	細菌性髄膜炎	-	-	-	◇
	感染性胃腸炎	307	13.35	5.73	◇		無菌性髄膜炎	-	-	-	◇
	水痘	-	-	0.10	◇		マイコプラズマ肺炎	5	0.83	0.09	◇
	手足口病	-	-	0.21	◇		クラミジア肺炎(オウム病を除く)	-	-	-	◇
	伝染性紅斑	3	0.13	0.07	◇		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	4	0.67	-	◇
	突発性発しん	4	0.17	0.14	◇						

急増減	↑	↓	前週と比較しておおむね1:2以上の増減
増減	↗	↘	前週と比較しておおむね1:1.5~2の増減
微増減	↖	↙	前週と比較しておおむね1:1.1~1.5の増減
横ばい	→	←	ほとんど増減なし

報告数が少数の場合などは、発生記号を記載していません。

インフルエンザ/COVID-19定点数(小児科定点を含む)	36
小児科定点数	23
眼科定点数	8
基幹定点数	6

(注) 過去5年間の同時期平均(定点当たり)

■ 全数把握感染症報告状況

類型	疾患名	報告数	累計	備考
2	結核	3	14	50歳代、70歳代・市外、80歳代
5	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	5	90歳代
5	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	1	10歳未満
5	梅毒	4	24	20歳代・2人、40歳代・1人、50歳代・1人

■ 定点把握感染症報告状況(週報対象)の推移

			インフル エンザ	(C O V I D 1 9) 新 型 コ ロ ナ	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎	(ロ タ ウ イ ル ス) 感 染 性 胃 腸 炎
報 告 数	広島市	第5週	149	104	24	5	44	250	7	1	4	2	-	-	-	11	-	-	5	-	1
		第6週	62	96	22	8	31	348	3	-	5	2	-	1	1	13	-	-	4	-	1
		第7週	57	88	22	5	35	295	-	-	1	4	1	1	1	7	-	-	4	-	1
		第8週	49	84	19	2	39	429	4	1	4	-	-	2	-	4	-	-	3	-	-
		第9週	37	102	27	13	31	307	-	-	3	4	1	-	1	1	-	-	5	-	4
定 点 当 た り	広島市	第5週	4.14	2.89	1.04	0.22	1.91	10.87	0.30	0.04	0.17	0.09	-	-	-	1.38	-	-	0.83	-	0.17
		第6週	1.72	2.67	0.96	0.35	1.35	15.13	0.13	-	0.22	0.09	-	0.04	0.13	1.63	-	-	0.67	-	0.17
		第7週	1.58	2.44	0.96	0.22	1.52	12.83	-	-	0.04	0.17	0.04	0.04	0.13	0.88	-	-	0.67	-	0.17
		第8週	1.36	2.33	0.83	0.09	1.70	18.65	0.17	0.04	0.17	-	-	0.09	-	0.50	-	-	0.50	-	-
		第9週	1.03	2.83	1.17	0.57	1.35	13.35	-	-	0.13	0.17	0.04	-	0.13	0.13	-	-	0.83	-	0.67
	全国	第7週	2.64	5.19	1.05	0.28	2.09	7.74	0.23	0.06	0.56	0.18	0.01	0.04	0.03	0.76	0.01	0.01	0.43	-	0.07
		第8週	2.21	4.95	1.21	0.29	2.44	10.32	0.27	0.06	0.56	0.20	0.01	0.03	0.03	0.82	0.02	0.03	0.37	0.01	0.11

ノロウイルスによる感染性胃腸炎に注意しましょう

【予防のポイント】

◆手を洗いましょう

食事や調理の前、トイレの後、吐物やオムツを処理した後など、石けんでしっかり手を洗いましょう。

◆食品は十分に加熱しましょう

特に、ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品は、中心部が85℃～90℃で90秒以上の加熱が必要です。

◆調理器具などを消毒しましょう

調理器具などは、洗剤を使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム(＊)または熱湯で消毒しましょう。

◆ふん便・吐物は適切に処理しましょう

患者の便や吐物には大量のウイルスが含まれていますので、処理をするときには手袋やマスクを着用しましょう。換気を行い、次亜塩素酸ナトリウム(＊)を含む消毒液を用いて速やかに処理しましょう。

＊次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用の塩素系漂白剤でも代用できます。「使用上の注意」をよく読んで、適切な濃度に薄めてから使用しましょう。



【参考】感染性胃腸炎(特にノロウイルス)について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/>

本週報は、速報性を重視していますので、今後調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。なお、感染症情報の詳細についてはホームページでご覧いただけます。

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/eisei/1003071/index.html>



【問い合わせ先】

広島市感染症情報センター/広島市衛生研究所 〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

TEL (082) 277-6575 FAX (082) 277-5666 E-Mail ei-seikatsu@city.hiroshima.lg.jp